□內政部登記證警字第一一二七號□

□本報特聘請吳之屛方家楨大律師爲常年法律顧問□

長壽

于右任

中華郵政特准掛號認爲新聞紙類

每份四分　第一一四期

中華民國廿三年八月十日

每逢星期五出版全年五十期連郵二元國外加倍

館址　上海三馬路雲南路口幸福書局內

□本期痢疾特刊目錄□

痢疾之常識
治痢膚見
泄瀉與下痢
我之治痢法
暑天熱痢休息痢
產後痢疾
痢疾驗方選
痢疾之診斷及治法
我之治痢經驗
瀉痢盛行之秋
赤白痢
痢疾虛實寒熱辨
暑痢濕痢
胎前痢疾
痢疾效方

痢疾之常識

合三

痢之定名　痢疾之名內經謂之滯下。傷寒論謂之下利。今人謂之痢疾。西醫謂之大腸炎。乃消化器病也。腸壁紅腫。道路窄狹。大便時欲便不能。故有裏急後重之見症。白則爲腸壁之膏油。紅則爲膏油破所出之血。名雖爲痢。實爲大便不利之病。惟有一種赤痢。另爲痢疾一種。每蔓延於熱帶地方。中國內地。不常有之。然寓意草（書名。喩嘉言著）。中所載之痢症。唐容川之生大黃暫一攻（見唐容川疾痢三字訣）者即是此症。此症易與他病合併。（如傷寒濕紅熱等病）故陳修園謂熱不休死不治。可知此症較前症爲重也。

痢之原因　痢之原因。分爲兩種。一爲動物性之痢病。一爲植物性之痢疾。動物性者由一種最下等動物所傳染。該動物用顯微鏡窺之。大於人之紅血輪。在人腸中以血輪爲食餌之。故人腹痛腸腫即由於此。此動物乃一千八百七十五年變虛氏所發見。至於植物性者。乃一千八百九十八年日本志寛潔氏。在患赤痢者之腸中。發見一種下等植物。分泌毒質。每爲激烈。患此病者。下血無度。每兼頭痛發熱之症。故西人列赤痢於八大傳染病中也。

痢之治療　痢疾之治法總以撲滅大腸之病菌爲第一。我國方常有當歸芍藥湯爲治痢之主方。方中之肉桂可以減去。炒連木香可以加入。再加滑石。用冲不用煎。此方效如桴鼓。蓋川連殺腸中之菌。而病原去。木香調腸中之氣。而腹痛愈。滑石爲礦物藥品。用藥冲而直入大腸。遇後作泄盡將腸中之濕熱泄去。用歸芍當芩養血淸熱以辦善後事宜。直絲入扣也。

痢之預防　痢疾之病菌。無論屬于動物者與屬於植物者。皆存患者大便之內。我國人之看護病者。多不講消毒之法。每于病人之糞便。隨便拋棄。蒼蠅羣集。而痢疾病菌。滿黏于蠅足。又何怪到處傳染哉。公共衞生之不講也久矣。既不能積極以治蠅。又不能消極以防蠅。一至病出。則遂乞靈於醫藥。幸而治愈亦已危矣。

朱振聲醫師

上海新新公司常年醫藥顧問

上海世界書局常年醫藥顧問

診例

（甲）門診一元
（乙）出診四元
（丙）[illegible]丸方四元
（丁）外埠問病二元
（戊）急病隨請隨到

號金不取　路遠遞加　原班同件

時間　門診上午[illegible]時至[illegible]午[illegible]時止　出診四時以後

電話九[illegible]九二

診所　上海[illegible]弄第一家

[illegible]號[illegible]啓

痢疾驗方選

鮑濟民

◎治紅白痢疾初起良方
葛　根二錢五分　炒苦參二錢　陳　皮二錢　酒炒赤芍二錢　炒麥芽三錢　炒山查二錢　細川連六分　陳松蘿茶葉二錢　水煎服數劑。小兒減半服。忌葷腥麵食。煎炒。閉氣發氣諸物。此方宜於腹不脹痛者。因腹無脹痛拒按之症。即不須攻下也

◎治痢疾初起腹中實痛。不可手按。此有宿食。宜攻下之。
酒炒廣大黃五錢　老木香五分　陳　皮一錢五分　姜汁炒厚樸一錢五分　荷　葉一小角　水煎服下積滯即止。或合丸　每服三四錢尤妙。

◎治噤口痢方　痢疾嘔逆。飲食不得入（乃邪熱穢氣塞於胃脘）書云。食不得入。是有火也。故用黃連。痢而不食。則氣虛。故加黨參。凡虛人久痢者。並用此法。
黨　參一錢　石菖蒲七分　姜汁炒川連七分　丹　參三錢　赤蓮肉二錢打　茯　苓二錢打　冬瓜仁二錢打　陳　皮一錢五分　荷葉蒂二個　陳米一合　用水煎慢慢服下。

◎噤口痢外治祕方
雄　黃一分　巴豆霜二分　辰　砂一分　草蔴子七粒　麝　香三厘　搗溶蜜丸。如茨實大。放眉心中間。鼻樑上正中。膏藥蓋之。只要一點鐘時。必腹內響。即思飲食矣。
又方用熟麵做成燒餅樣大。分爲二片。以一片中空之。用木鱉子三個。去殼搗。碎如泥加。麝香五厘。梭勻。塡入餅心。貼肚臍眼上。外用手帕紮定。用煖茶壺隔布熨臍腹。待腹中作響聲。喉中知有香氣。即思飲食。能進藥物。是夜痢減大半。二三日漸愈。

◎治痢疾又一妙方
川　連三錢　木　香一錢　條　芩二錢　白芍四錢　茯　苓三錢杵　當歸鬚二錢五分　生甘草一錢半　飛滑石粉四錢　用所煎藥汁冲服。不必和煎。　上藥用水煎服數劑可愈。

◎紅白痢及水瀉神效丸
木香　沉香　乳香去油　沒藥去油　黃柏　川連　赤石脂　辰砂硃　甘草　眞川雲土鴉片煙灰　每味五錢或一兩。研細末乳。至無聲爲妙。用水泛爲丸。如栗子大。晒乾備用。　（服法）大人每次四分。小兒減半。有烟癮人加倍。用開水香服。如痢初起。身覺微寒微熱者。加　煨葛根二錢。煎湯送丸。如痢初起。覺小腹實痛拒按者。加　大黃二錢　焦　查二錢　焦麥芽三錢　煎湯送丸。如遇吐嘔者加　藿　香二錢　煎湯送丸。如水瀉者。加　灶心土三錢　炒白扁豆打二錢　焦　朮一錢　煎湯送丸。病輕者一二服。重者四五服即愈。如最重者。須服至大便糞色正黃爲止。切勿誤會。痢未愈。另投他藥。爲害非淺也。

治久痢不止
石榴皮燒灰存性研末。米湯飲下二錢。
（按）初痢必兼通下。久痢則當止濇。此治痢大法也。石榴皮味酸氣溫。濇腸止痢。功與御米殼赤石脂相若。故克治之。

治痢疾兼有表症者

葛根（錢半）　黃芩（一錢）　黃連（五分）　甘草（八分）　水煎服

痢疾無表症者易治。有表症者難治。所謂表症者。即除大便下痢之局部症狀外。復有身熱怯寒頭疼脈浮之全體症狀也。是項全體症狀。最爲治療之掣肘。蓋以下劑蕩滌腸垢。則表邪即有內陷之虞耳。本方以芩連治痢。即以葛根解表。內外合治。並行不悖。此仲景立方之神妙。（是方出傷寒論）所以爲百世推崇也。

治痢膚見

袁春泉

痢疾白屬氣分。紅屬血分。其說近理。至於以白爲寒。以紅爲熱。則不盡然。然亦有氣虛氣實血虛血實之分。而虛者屬寒。實者屬熱。須知寒與熱。極易明辨。如脈數。苔黃膩。小溲熱赤。身熱不停。即是暑熱之痢。如脈細小沈遲無力。舌苔薄白光潤。小溲青白。即是虛寒之痢。白屬氣虛。紅屬血虛。。然亦偶或有人。吾嘗用白痢之方。如姜。川樸。甜茅朮。炒陳皮。生甘草。飛滑石。生石芎。淡黃芩。姜川連。光杏仁。苦桔梗。煨石膏。糯米。而奏效者。至於紅痢日久。惟有斗門方爲最效。如黑豆。乾薑。生白芍。生甘草。地榆炭。蜜炙罌粟殼。分兩臨症酌用。雖遇膿血噤口。治之並效。然亦有死證而不能治者。不可不知。如痢下純血者死。如腐肉色者死。如屋漏水者死。厥逆冷汗者死。厥逆不止者死。大熱不退者死。噤口不食藥不能開者死。驟然能食爲除中者死。雖有名醫。恐亦不能爲力矣。又有痢下如赤豆汁者不治。唇若塗硃者不治。大孔如竹筒注者不治。若治之得法。亦有一二生全者。又有痢下如魚腦者難治。如豬肝色者難治。身熱脈大者難治。穢臭不可近者難治。若用藥的當。亦可轉危爲安。不可棄而不治也。又有紅白痢疾的驗方。用之極效。方用炒車前。（研細二錢）飛滑石。生甘草。陳皮。姜。川樸。花檳榔。焦山查。（以上各一錢）紅麴三錢。燈芯二束。麩枳實。炒澤瀉。各一錢半。廣木香。酒磨六分。同煎服。又有東坡居士薑茶方。生姜。細茶葉。各三錢。濃煎服之頗效。

泄瀉與下痢

郭柏良

飲食入胃。下輸於腸。吸其精華。其渣滓即由直腸排出。而爲糞便。飲食有度則便下如常。如飲食不節。或食生冷及腐敗之物。則不利於腸胃。消化上發生影響。成爲泄瀉或下痢。故泄與痢。同爲胃腸病。

瀉痢雖屬腸胃病。二症截然不同。論其原因。泄瀉爲消化不良。腸壁失其吸收之作用。腸內不能容積。或不及消化。此多量之容積物。存於腸中。甚感困難。故登生蠕動。驅之外出。下痢多由食不潔之物。感染黴菌。在腸中蘊化。賊及腸膜。腸部爲自衛計。頻起蠕動而下痢。論其證狀。泄瀉則暴注洞泄。或溏薄。或純屬水分。有時腹痛。有時亦不覺腹痛。下痢則腹痛頻頻。裏急後重。及如廁又不爽利。所下多黏膩如腐凍之物。其色或白或赤。或雖糞便。或竟純下黏物。

治瀉有五法，一曰淡滲。分清降濁。使水分從小便而去。如農人下治溝。導其流。雖處低窪。不受巨浸。二曰清涼。如熱泄而暴注下迫者。投苦寒之劑。以去燔蒸。三曰疏利。痰凝氣滯。食積水停。腸胃不能容而成瀉者，宜隨證祛逐。勿使稽留。四曰健運，腸胃機能薄弱。消化不良。則促起其消化機能。克奏其運化之功。前人有『溫腎』『燥脾』等法。皆此理也。五曰固澀。泄瀉日久。幽門道滑。須用澀劑。則變化不忒。授補合節。所謂滑者澀之是也。

治痢之法。以清熱導滯爲最要。清熱。含有消炎與撲滅黴菌意義。導滯則祛瘀達邪。清肅腸部。庶無後患，

我之治痢法

錢煊伯

今歲入秋以來。痢疾頗盛。蓋寒熱必由暑溼積滯而起。初起痢疾胸悶。腹疼便洩。二三日後。便洩稀而變成痢矣。每試不爽。或紅或白。點滴而下。其脈有弦數有沉細。其舌苔有根膩尖絳。有滿白或灰濁帶黃之類。內經以痢疾爲腸澼。先賢論醫藥失當。即成不治之症。予治痢疾。第一洩其陽分與陰分之邪。以退寒熱。其次開洩中宮。使其胃氣調達。無鬱結之患。要知胃與大腸。手足陽明。本屬一氣。施治之法。如挾表者仿香蘇飲之意。氣虛者仿玉屏風散之意。溼阻者仿桃花湯之意。均可隨症參用。若因營分有熱者。則白頭翁湯。最爲神妙。今歲秋初。正義胡某。患紅痢。次數無度。邀予往診。投以此湯兩劑。病即霍然。可見古方之神妙。誠有不可思議者也。

幸福書局出版醫藥新書
地址上海三馬路[illegible]書[illegible]路轉角

婦女病 全書二冊 實售一元 外埠函購寄費一角
求孕與避孕 全書二冊 實售一元 外埠函購寄費一角
腎病研究 全書二冊 實售一元 外埠函購寄費一角
百病秘方 全書二冊 實售九角 外埠函購寄費一角
保腦新書 全書一冊 實售[illegible] 外埠函購寄費九分
胎產問題 全書一冊 實售[illegible] 外埠函購寄費九分

暑天熱痢

純

暑天熱痢。宜治以六一散。然南方之暑熱。多兼濕。用六一散。誠爲至當。北方之暑熱。恒不兼濕。且有兼用之時。即用六一散時。原當有所變通。愚嘗擬得一方。用之甚效。方用滑石生石膏各五錢。硃砂粉甘草細末各二錢。薄荷冰二分。共和勻。每服二錢。開水送下。熱甚痢劇者。一日可服五六次。名之曰加味益元散。蓋因六一散加硃砂。爲益元散。茲則又加生石膏薄荷冰也。按暑熱之痢。恒有噤口不食者。因暑氣瀰漫於胃口也。而治以加味益元散。即可振興其食欲。若非暑熱之痢。而亦不思飲食者。宜用硃砂粉甘草細末等分。加薄荷冰少許。濃煎鮮竹茹湯送下。（無鮮茹乾者亦可用）即可思食。蓋此等證。多係肝胆之火。挾胃氣上逆。其人聞食味即噁心欲嘔。所以不能進食。用硃砂以降胃鎮肝。甘草以和胃緩肝。竹茹以平其逆氣。薄荷冰以散其鬱熱。所以服之即效也。因用此方屢次奏功。遂名之曰開胃資生丹。

又有當暑熱之時。其肝胆腸胃。先有蘊熱。又更奔走作勞於烈日之中。陡然下痢。多帶鮮血。其脈洪大者。宜治以大劑白虎湯。煎湯數鍾。分數次溫飲下。每次送服鴉胆子仁三十粒。若其脈雖洪大。而按之虛者。可用大劑白虎加人參湯。送服鴉胆子仁。

休息痢

純

休息痢者。其痢原不甚重。而不易除根。治愈恒累次反覆。雖遷延期久。而猶可支持。有若阿米巴痢之輕者。至累月累年不愈。而猶可支持也。或此等痢即阿米巴痢歟。亦無由得知。然此等證。多因有毒菌伏於大小腸曲折之處。是以愈而復發。惟用藥除淨其毒菌。則不反覆矣。至除之之法。其證近於熱者。可治以鴉胆子。而以治痢之藥佐之。近於涼者。宜除以硫黃末。而以治痢之藥佐之。無論或熱或涼。所用藥中。每劑皆宜加木賊一錢。爲其性善平肝去腸風。能止治不痢也。諸家本草。謂其善愈休息痢。洵不誤也。其脾胃健血壯者。又宜兼用健補胃之藥。以清痢之上源。自能祓除痢之病根也。

噤口痢方

老藕搗汁煎熟。稍和砂糖。頻服。

下痢而至不能食。此胃氣已竭之徵也。然大劑補藥。又非虛甚者所能受。故必以甘平養胃之品如藕汁者。緩緩調補。冀其胃氣一復而後。可以收斂劑止其痢也。

產後痢疾

仁

（治法）大抵產後下痢。惟顧虛元神。調和氣血。則積滯自下。緣產後氣虛血虧。抵抗力薄弱。一切賊邪外氣。每易乘虛而入。若用普通治法。以蕩滌腸胃。則鼓氣不足。藥力雖施。濁邪不能盡去。且虛者不勝其攻擊。元氣愈踣。邪氣益張。不啻於絕地不止。即壯實之婦。元氣未敗。亦當於消導方中。加入調氣養血之藥。方不至有誤也

產後痢疾。有因飲食積聚者。有因寒氣內陷者。有色白者。有色赤者。又有新久之別。有無後重之分。皆當分別治之。

由於傷食。以消食爲主。調氣方中。加入山查神麴等味。由於寒氣內陷者。大都脾胃虛弱。以溫補爲要。肉桂附子。亦可酌用。色赤者血虛。四物湯中加荊芥人參。色白者氣虛。六君子加木香肉菓。新痢者酌用消導。久痢者必溫補。後重者有餘。宜生化湯。（當歸川芎乾姜炙甘草桃仁）去乾姜加木香茯苓。無後重者虛滑。宜六君子加木香肉菓。

（死症）產後痢疾。輕者尚可治。重者死多活少。故甚危險。大凡脈洪大者。厥逆者。煩躁者。呃逆者。噤口不食者。在常人尚可挽救。產後多屬不治。

痢疾虛實寒熱辨

張樸公

痢症實熱者。口渴多喜冷水。虛熱者。但渴而不喜冷。實熱者。必腹痛脹而拒按。虛熱實。雖痢出膿血。刮腸剝膚者。痛而不脹。并喜手按。實熱小便短赤澀痛。虛熱者。水從痢去。液以陰亡。溺亦短赤。但不熱不痛。實熱者。裏急後重。虛熱者。圊後不減。以解後愈虛也。若無熱症證。而痢不止。乃裏急頻見汙衣者。皆虛寒也。非溫補不可。

暑痢

許小士

(病形)痢下鮮紅。小便不通。腹內攻痛。面垢嘔逆渴欲引飲。發微自汗。

(診斷)脈滑數。苔垢膩而黃。暑邪侵淫。脾胃運輸無權。致成暑痢。

(治療方法)與暑瀉同。可兼進岑連荷葉等品。(變前)加木香檳榔等。失治變水穀痢。

濕痢

許小士

(病形)痢下赤白。不利小便。腹不甚痛。胸脘作悶。渴不能飲。飢不欲食。身體倦軟。

(診斷)脈象濡小。苔膩而滑。長夏濕鬱中洲。脾胃消穀失司。清氣不升。溷濁不降。而濕痢也。

(治療方法)脾臟喜燥。宜燥濕運中。而利小便。可仿五茯湯。加厚朴陳皮治之。失治變濕腫。

胎前痢疾

仁

(辨症)辨症爲最要之舉。醫之辨症。猶法官之鞫詢也。鞫詢既審。案之因果。可以大白。得按律判決。辨症既明。病之根原變化。詳悉無遺。得以對症用藥。無有差忒。痢疾有不可不注意者五端。孕婦患痢。尤宜注意。

一身熱。下痢爲裏氣受病。若兼身熱。則表裏俱病。此宜先用和營透表之藥。然後徐徐清理其中。若患痢已久。胃氣中虛。起居不愼。新感風寒而發熱者。當表裏同治。不可先治其表後清其裏矣。以內氣久虛之人。其抵抗力甚薄。方中又須加入參朮之屬。助其正氣。若久病發熱。非由新感而來。脈遲細。或虛大無力。乃眞陰內亡。虛陽浮越於外。當用參朮吳萸阿膠之類。附子肉桂。附熱回陽之力甚大。平日可用。在孕婦則當禁忌。所以防胎墜也。

二腹痛 腹痛有虛寒實熱之別。痛有止歇。奔迫下墜。不及如廁。及痛而脹滿。不勝按摩者。實熱也。痛無止歇。而不絞痛。及不滿而喜按者。皆虛火也。當分別治之。

三後重。濁氣阻滯。則見後重。初痢後重。宜開其滯。久痢後重。當升其陽。孕婦患痢。一見後重。不論胎之大小。若脈來勁實。見有餘之象。則宜調氣。脈來微弱。見不足之象。即用升提。一切滋膩補血之藥。一概屏除不用。

四小便。小便通利。胎必無虞。若小便不通。宜補中益氣。稍加車前澤瀉。以升清降濁。如響斯應。後效甚速。

五飲食。痢以噤口爲重。故飲食一端。最堪注意。初起不食。濁甚而元氣未傷者。理其滯氣。飲食自進。若初起能食。旬日以後。反不食者。及服苦寒之藥及蕩滌太過。胃氣受損也。宜補其中氣。

(治法)孕婦患痢。醫治之法。無異於常。其要在於保胎。故忌破氣下氣。不善治痢者。峻用苦寒蕩滌。既耗其津液。復動甚胎氣。必致僨事。治法。以調氣養血爲主。當歸砂仁。爲方中要藥。丹溪謂先托住正氣。以固其胎。而後順氣和血。佐以稍積導滯。此治孕婦痢疾之要法也。

痢疾効方

廣木香(四兩) 苦參(酒炒六兩) 爲末將甘草一斤煎膏如丸和桐子大每服三錢

苦參大苦大寒。既能消腸中之炎。又堪殺痢疾之菌。用以爲君。木香辛溫除後重。甘草甘平和中宮。所以佐君藥以立功也。

人生要立身社會謀幸福者?請讀

青年之友

[illegible]

因[illegible]

因爲他是青年前途的明燈

因爲他是大衆處世的顧問

茲將本書內容要目舉略如下

青年應有的認識……希望青年去做切實工作……

青年失業之原因……給前進的青年……

青年三大要求……怎樣可免青年的色慾……

青年怎樣去做……怎樣指正青年的前途……

青年良好習慣……怎樣救濟失學的青年……

[illegible]

青年勿作[illegible]自[illegible]……青年何[illegible]如[illegible]……

青年應負的責任……處世碎錦五十餘則……

全書一冊特價祇收大洋二角寄費加一

總發行所上海三馬路雲南路幸福書局

郵票十足通用

痢症之診斷及治法

張思卿

痢症古名滯下。其證裏急後重便膿血。此其同也。惟有發熱惡寒者。有發熱不惡寒者。有不發熱而微惡寒者。此其異也。臨症時須於同中註其異。再于異中酌其同。方爲面面俱到。擬方法如左。

(一)痢症有發熱而兼惡寒者。此有表證也。有汗當用桂枝湯(桂枝、芍藥、甘草、生姜、大棗、)方法、無汗當用葛根湯(桂枝湯中加麻黃葛根)方法。鼓邪外出。然後再治其痢。

(二)痢證有發熱而不惡寒者。此無表證也。宜用芍藥湯(芍藥、梔子、甘草、黃連、石膏、連翹、薄荷、)方法、調氣行血。以清內熱。

(三)痢證有不發熱不惡寒者。此裏寒證也。宜用理中湯(人參、白朮、乾姜、甘草、)方法。以祛寒。或平胃散(蒼朮、厚朴、陳皮、甘草、)加木香乾姜澤瀉猪苓之類的

(四)裏急至圊反不能即出者。氣滯也。疏通爲主。如木香枳殼厚朴檳榔陳皮蔻仁之類。

(五)裏急頻見汚衣者。氣脫也。補澀爲主。如黨參白朮桔梗烏藥之類。

(六)後重至圊稍減者。火迫也。清火爲主。如黃連黃芩大黃之類。

(七)後重至圊轉增者。下陷也。升提爲主。如升麻葛根之類。

(八)痢證有脫肛者。熱則肛門閉。寒則肛門開。磁石爲末。食前米飲下二錢。外用鐵銹湯洗之。

(九)痢證有屢止屢發者。名休息痢。因用澀太早。或不能節飲食。戒嗜好。所以時作時止。宜用四君子。或補中益氣。加香連肉蔻之類。

(十)噤口痢。食則便吐。或飲食不能進。此上焦火迫也。宜用大承氣湯。(大黃、芒硝、厚朴、枳實、)或葛根黃連黃芩甘草湯。相需爲用。生死關頭。在此用藥。

(十一)久痢成壞證。變態百出。無論其脈。無論在證。只宜以參附著朮香砂。補脾健胃。常有得生者。

(十二)痢證脈沈小濡細者吉。洪大滑數者凶。脈大爲未愈。微弱爲欲止。身雖熱不死。

痢疾不可妄食

李健頤

痢疾古名腸澼。爲因食物積滯腸中。復加暑熱外浸。蒸釀毒火。灼爛腸管。變成痢疾。治法宜先瀉出胃中積物。腸內毒垢。則破爛之粘膜。自可收口而愈。然痢已獲愈。而痢後不可不戒食物。俗云。痢病能食不死者。以痢爲腸胃病。易傷胃氣。凡胃氣傷者。多不思飲食。能食者。胃氣未傷也。世人誤解此說。以爲患痢者宜如常飲食。食則不致危險。遂恣食亂飲。不知忌戒。夫腸胃間。本因積滯未消。以成斯疾。今再進新物於內。雖免剌戟腸中粘膜。反增熱劇。雖然未呈壞症。亦必因此而留連難瘳。或轉久痢。豈可不愼哉。西醫有饑餓療法。謂人患痢時。腸中粘膜必有紅腫之處。其處生出膿液。即白痢。若血管破爛。有血流出。即紅痢。不可再以食物剌戟其粘膜。又曰。痢症新愈之後。食物尤當禁止。朱丹溪曰。減其粥食。絕其肉味。可見患痢疾者。一切食物。皆宜摒除。初愈之後。只有服藕粉湯。或綠荳粥。至二星期後。即可漸進鯽魚湯瘦肉汁。以補腸液。若見口渴者。宜與女貞旱蓮草代茶。又須愼風寒。戒房事。調養至百日外。方無後患。

我之治痢經驗

王肖舫

痢症古名滯下。各醫書所載。僉云紅痢屬血分。白痢屬氣分。調氣則裏急自愈。行血則後重自除。殊不盡然。此症多發於夏秋之交。內蘊之暑濕未消。或因恣啖瓜果及生冷諸物。逼住內熱。日久化燥。將腸內津液消耗。不能潤澤腸內壁。又值秋天燥令。與大腸燥金之府。兩相承旺。所以腸內壁。因燥而生熱。腸中氣化。因燥而生滯。紅痢者。乃腸內生炎。將其血管因磨蕩而破裂。故其痢紅也。白痢者。乃腸內蠕動滯濇逼迫腸涎下注故其痢白也。絕非白屬血。乃是腸肉燥氣蘊隆所致也。

故治痢症以潤燥。爲第一要義。然初得此病。尚未化燥時。常以消導和中爲主。熱者清之。滯者調之。既而化燥因循未愈者。必以潤燥爲先。日久未愈。疏洩滑竅者。方可用固中氣澁大腸之法。

余治此病。每用潤燥湯恆多獲效。方用當歸身三兩杭白芍一兩生用桹榔三錢車前子三錢炒水煎成加蜂蜜一兩冲服。有食積者加萊服子三錢炒有熱者加炒黃連一錢五

某報。載有治痢一方。用芝麻汁四兩。白蔗糖四兩。攪勻空心服。余每用此方加蜂蜜一兩。每獲奇效。此方純係潤燥法。蓋腸潤則不燥。不燥則熱除。其腸內之熱。因燥而生。因蠕動而磨蕩生電。原非實熱。最忌苦寒。至於溫熱盛行時之疫痢。及單獨因受暑熱之熱痢。不在此例。

痢疾經驗方

米煥章

痢爲險惡之症。生死所關。治不得法。多致不救。曾生書當歸導滯湯一方。或紅或白。或身熱腹痛。或裏急後重。或溫熱病後痢疾。無不奏效。洵良方也。

當歸導滯湯

當歸。白芍各三兩。萊菔子一兩。車前子炒研。枳殼麩炒。桹榔甘草各三錢。水煎。入蜜服。紅痢加桃仁。

此方之奇。全在重用當歸芍藥。蓋泄瀉最忌當歸之滑。而痢疾則最喜其滑也。白芍味酸入肝以和木。使木不侵脾土。枳殼桹榔消逐濕之邪。車前分利水濕。而又不耗眞陰之氣。萊菔辛辣除熱去濕。又能上下通達。消食利氣。使行於血分之中。助歸芍以生新血而蕩滌其瘀血也。加甘草蜂蜜以和中。則又無過烈之弊。奏功之神奇。實有妙理耳。熱加黃連二錢黃芩二錢。日夜無度或裏急後重之甚者。加大黃木香。愚每用歸芍各一兩。萊菔子四錢。車前子枳殼桹榔甘草各二錢。病輕者亦效此經驗方也。

瀉痢盛行之秋

英

一瀉痢盛行於秋令之故

夏日既去。秋令已至。氣候驟寒。不僅夏日蘊伏之寒涼。待機爲病。且夏令肌膚毛竅弛張。一至秋涼。毛竅猶未固密。自易招涼受寒。尤以夏季飲食濫進。消化之機能。本不健旺。宿滯停積。一受寒涼。更無消化之能力。以是秋令中之病症。頗爲瀉痢。皆消化系能力薄弱。又受外感所致之病也。

二瀉與痢之分別

泄瀉與痢疾。同爲腸胃病。惟泄瀉者。泄瀉淸水或稀薄之糞質。當其瀉下之時。循腸而下。極爲暢利。絕無留難之狀。痢疾者。瀉時非常困難。少腹往往作扭痛。瀉下之物爲膿凍狀。次數甚多。而瀉下之物少而且艱。大抵一陣作痛。即須登廁。用力助其推下。所得之物實甚少。不過白凍或紅膿一二三球而已。痢疾甚者。一晝夜達六七十次之多。次數愈多。則得物愈少。此與『泄瀉症』絕對不相同之處也。故治法亦異。

三概瀉且痢

瀉痢二症。症象絕異。固不能同時並作。但頗多由泄瀉而轉爲痢疾者。起初泄瀉一二日。漸漸稀少。若其外邪逗留不淨。止濇太早。或又貪食滯停腸中。即易漸漸變爲痢疾。故痢疾頗多由泄瀉而變。此乃醫治不力所致。其中尤以小兒爲最多。當由瀉化痢之際。攻之既屬不可。瀉之亦所不宜。此際用藥。最宜謹愼。

四治法方針

治泄瀉之症。取散寒。利水。厚腸諸法。鮮有宜用攻下之法者。治痢疾之症。凡無外感。攻下皆不厭其早。痢疾亦分多種。治法繁多。咸宜對症而發藥。初起所用攻下之法。乃其治療之綱要耳。

幸福書局　代售各種良藥
地址上海三馬路雲南路轉角

遺精敵丸　有夢而遺　無夢而[illegible]　久患新起　服之如神　每大盒洋一元

保腦丸　用腦過度　鼻流[illegible]　腦[illegible]異常　一服即愈　每大盒洋五角

白濁丸　白濁初起　[illegible]　[illegible]定痛　效如桴鼓　每大盒洋一元

吐血靈丹　肝火犯肺　[illegible]　[illegible]吐血　服之立止　每大盒洋五角

獺肝[illegible]痛散　女子善鬱　肝病[illegible]　[illegible]定痛　靈驗無比　每大盒洋四角

赤白痢

潘蘭坪

痢色有赤白之不同。因其受病有熱重濕重之各異。熱勝於濕。則傷胃之血分。而爲赤痢。濕勝於熱。則傷胃之氣分而爲白痢。若赤白各半。則氣血兩傷。治法當宗劉河間先生調氣和血之旨。（和血則膿血自愈調氣則後重自除）茲因將赤痢白痢赤白痢。分症處方治之。

（一）赤痢方

金銀花三錢。建神麴錢半。山查核二錢。當歸身一錢。紅麯米一錢。生甘草八分。雲黃連一錢。或加陳茶。紅糖各三錢。同煎。痢色赤甚。或酌加紅花。六七分。地榆七八分引。

熱甚黃連銀花。再加一二錢。濕加滑石。防風。食滯加萊菔子。苗厚樸。腹痛頻。加木香數分。便濇滯而大痛。加酒炒大黃數分。或錢零。若久痢微痛。濇滯而燥渴者。爲下多傷陰。加生地。阿膠。黑芝麻。白芍。（去二麯山查連）或獨用六味地黃湯主治。凡痛緩積稀爲熱滯漸去。當和血。生熟地黃。生製首烏。當歸。白芍。黑豆。黑芝麻爲要藥（去二麯連山查）

（二）白痢方

川滑石三錢。炒銀花二錢。建神麴錢半。泡蒼朮一錢。錦菌陳二錢。生甘草五分。防風肉一錢。加炒香蓮葉二錢爲引。（鮮乾任用）

濕微或濁。減蒼朮。濕盛不渴。加蒼朮。或再加白朮。茯苓。另有見症。當加藥當看前赤痢症所列。

（三）赤白痢方

銀花三錢。建麯錢半。青皮五分。防風八分。滑石三分。黃連七分。（土炒）陳皮五分。甘草八分。加當歸五分加蒼朮五分爲引。如赤多於白。當歸倍蒼朮。（或再加多些銀花黃連）白多於赤。蒼朮倍當歸。（加多些防風）服二三劑後。若得痛緩積稀。加白朮。茯苓。當歸。白芍以調和氣血。（去滑石。青皮。或再去黃連。蒼朮。減少銀花。或再加木瓜。甘草改用炙。）另有見症。當加藥。仍看前赤痢所列。

凡久痢仍脈數有熱。香連丸黃連。吳萸。木香。倘赤白將盡。症轉脈虛自汗。眞人養臟湯。（人參。白朮。當歸。白芍。肉桂。粟殼。訶子。肉豆蔻。木香。炙艸。）訶子散。（粟殼。訶子。乾薑。陳皮。）在所必用。經驗赤白痢方。銀花。滑石。各等分。多煎代茶漫飲。（又赤痢銀花倍滑石。白痢滑石倍銀花。）痢已久便仍滯。加打破黑芝麻同煎。口乾渴。加生粉葛肉同煎。

❋　❋　❋　❋　❋

痢疾誤治致死

張一帆

凡久患痢疾之人。若被醫家屢用苦寒攻伐之藥。必致其人委頓困憊。臥不能起。若病人肛門洞開。不能收斂者。必死不治。故痢疾初起時。用藥亦貴得當。最妥穩者莫如疏導湯。

疏導湯　治痢疾初起。無論赤白。各色腹痛下墜。各證均宜以此湯主之。若兼他證。再佐以他藥加減之。此方治痢極有神效幸勿忽視。

淡竹葉三錢　猪苓三錢　厚朴二錢　廣木香錢半　澤瀉二錢　肉蓯蓉二錢漂

入水與藥平。煎八分茶杯。溫服。

如偏熱在上焦者。加金銀花二錢半。熱在中焦者。加川黃連一錢半。熱在下焦者。體壯者加大黃一錢半。體弱者加番瀉葉一錢半。如有食積者。加炒檳榔二錢。郁李仁一錢半。如有血瘀者。加當歸三錢。桃仁二錢。如下血者。加槐角三錢。炒地榆二錢。旱三七二錢。（研）

如腹疼甚者。加肉桂（上好的用八分。中的用一錢四分。次的須用二錢。）柴胡二錢。如兼頭暈頭痛者。加天麻二錢。薄一錢半。荷葉三錢。

如夾氣肝火熾者。加白芍二錢。製香附二錢。